



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ  
НАДЗОРУ  
(Россельхознадзор)**

**Управление Федеральной службы  
по ветеринарному и фитосанитарному надзору  
по Челябинской и Курганской областям  
(Управление Россельхознадзора  
по Челябинской и Курганской областям)**

Комсомольский пр., д.94, г. Челябинск, 454100.

тел. (351) 773-64-47, ф. 773-59-98.

E-mail: [rshn36@fsvps.gov.ru](mailto:rshn36@fsvps.gov.ru)

<http://www.rsn-chel.ru>

**25 ИЮЛ 2023**

№

*27/05-3405*

на № \_\_\_\_\_

О направлении информации

Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям в связи с наступлением активного вегетационного периода Борщевика Сосновского сообщает о необходимости размещения на официальных сайтах администраций муниципальных районов Курганской области информации о способах и сроках борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения на территории Курганской области, а также направляет рекомендации по борьбе с ним.

Приложение: Информация о способах борьбы с Борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения на 3 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности  
заместителя Руководителя Управления

Г.О. Жернов

Шаповалов Максим Валерьевич  
Заместитель начальника отдела  
государственного земельного надзора  
тел: 8-(352-2) 42-84-65, E-mail: [zashita\\_kurgan@mail.ru](mailto:zashita_kurgan@mail.ru)

**015184**

## **Информация о способах борьбы с борщевиком Сосновского на землях сельскохозяйственного назначения**

Борщевик Сосновского (*Heracleum sosnowskyi*) – многолетнее травянистое растение семейства зонтичные. Впервые новый вид Борщевика был выделен и описан в 1944 году, получив название в честь ботаника Дмитрия Сосновского. Его естественным местом произрастания являлись горные леса Кавказа. Из-за своей морозостойкости, неприхотливости в выращивании, урожайности и силосной массы уже с середины XX века он активно культивировался в союзных республиках в качестве корма для скота. Однако впоследствии ученые поняли, что растение не только быстро дичает, но и по пути практически полностью уничтожает встречающиеся экосистемы. В настоящее время борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры, он внесен в отраслевой классификатор сорных растений России.

В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, в том числе борщевиком Сосновского. В случае выявления территориальными управлениями Россельхознадзора нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований, к нарушителю земельного законодательства принимаются предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений.

Цикл развития длится до 8 лет. Одна из существенных особенностей Борщевика – отмирание его после плодоношения. Он цветет и плодоносит за свою жизнь один раз (монокарпическое растение), размножается в основном семенами. Корень стержневой, в ширину разветвленный, утолщенный. Основная масса корней располагается в почве на глубине до 30 см. Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность, одно растение может давать до 20 тысяч семян. Устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

Растение ядовито для человека. Установлено, что большая часть ядовитых веществ локализована в наземных частях растения. Его стебли, листья и плоды содержат эфирные масла, богатые фуранокумаринами – фотосенсибилизирующими веществами, которые при попадании на кожу могут повысить ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к

острым дерматитам, протекающим по типу долго незаживающих ожогов. Достаточно незначительного попадания сока на кожу, как под воздействием света на коже возникают сильные ожоги с волдырями, заполненными жидкостью. Такие ожоги очень болезненны. Поскольку у Борщевика нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним затруднена. Тем не менее, побороть этот злостный сорняк возможно. Главный принцип – не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер или, упав в почву, они будут прорасти в течение ряда лет.

Для работы в небольших малочисленных популяциях Борщевика Сосновского (100-1000 растений) можно применять совокупность методов: подрезания корней, скашивание надземной массы косой или при помощи сенокосилки и химические обработки.

Для борьбы с большими популяциями (более 1000 растений) требуется специальная техника для проведения вспашки / механического покоса растений, проводят лущение дисковыми лущильниками на глубину до 10-12 см, что позволяет подрезать и измельчать корни Борщевика. В результате у них снижается способность к накоплению запасных питательных веществ и они затормаживают свой рост и развитие. Вспашка на глубину до 25 см и более перемещает разрезанную корневую систему сорняка из нижних слоев в верхние. При этом нарушается контакт растения с почвой, а, следовательно, ограничивается питание растения, что приводит к истощению его и гибели.

Высев многолетних трав после вспашки (овсяница красная, райграс пастбищный, мятлик луговой) с нормой высева семян 150 кг/га также является одним из эффективных способов борьбы с Борщевиком. Сеяные многолетние травы препятствуют проникновению света к прорастающим растениям Борщевика и являются конкурентами Борщевика в поглощении из почвы влаги и питательных веществ, а скашивание фитоценозов с содержанием в нем этого злостного сорняка предотвращает его обсеменение.

Одновременно с механическими мерами борьбы применяют химические обработки гербицидами. Гербициды, попадая на листья сорняка и проникая внутрь, передвигаются по сосудистой системе и вызывают гибель не только его надземной части, но и повреждают корни. Эффективность применения гербицидов зависит от количества действующего вещества, проникшего в растение и достигшего зон непосредственного действия. Особенностью широколистных двудольных растений является то, что точка роста находится на верхушке стебля или в пазухах листьев, она открыта и незащищена. При опрыскивании капли гербицида легко попадают на незащищенную точку роста, в результате действия яда она отмирает и растение приостанавливает свой рост и развитие. Наиболее эффективно в

борьбе с Борщевиком показало использование баковой смеси на основе изопропиламинной соли глифосата кислоты и диметиламинной соли в ранний период развития растений (в фазу розетки листьев и стеблевания) в дозе 5 кг/га.

При систематическом и последовательном применении агротехнических и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается.